

**TIPPS & TRICKS FÜR DEN UMGANG
MIT DIALYSEPATIENT:INNEN:**



Nieren- & Lipidzentrum Spandau

Dr. med. Ralf Strzelecki
Dr. med. Jens Ringel
Prof. Dr. med. Michael Haase
Dr. med. Daniela Jürgensen

Lynarstraße 12, Haus 18
13585 Berlin

Telefon 030 - 33 505 66-6
Fax 030 - 33 505 66-7
Rohrpost 180

www.nlzs.de

🕒 ÖFFNUNGSZEITEN

Mo, Mi, Fr 07.00 -19.00 Uhr und Di, Do, Sa 07.00 - 18.00 Uhr

📞 TELEFON

Unter o.g. Nummer immer erreichbar, außerhalb der Praxisöffnungszeiten besteht für dringliche Dinge eine Weiterleitung auf das Diensthandy.

👥 KONSIL

Zunächst telefonische Absprache zu Zeitpunkt, Dringlichkeit und erste anamnestische oder/und laborchemische Angaben. Dann eine schriftliche Konsilanforderung mit Patientenetikett per Fax.

📍 TIPPS & TRICKS

Für den Umgang mit Dialysepatienten siehe Rückseite!

TIPPS & TRICKS FÜR DEN UMGANG MIT DIALYSEPATIENTI:NNEN:

TIPPS & TRICKS FÜR DEN UMGANG MIT DIALYSEPATIENTEN:

- Uns telefonisch über die stationäre Aufnahme eines Dialysepatienten informieren und Terminabsprache.
- Dialysestartzeiten für Krankenhaus-Patient:innen:
Mo|Mi|Fr 07.00 Uhr und 13.00 Uhr Di|Do|Sa 07.00 Uhr (nur früh!)
- Die Akte und Kurve der Patient:innen zu jeder Dialyse bitte mitgeben.
- Labor: ORBIS-Auftrag von Ihnen, Monovetten mit Klebern zur Dialyse mitgeben, dann erfolgt die Abnahme hier
- Mindestens 1x pro Woche Labor: Natrium, Kalium, Kalzium, Phosphat, Kreatinin, Harnstatus, Albumin, CRP, Blutbild, venöse BGA
- 1x pro stationärer Aufnahme Labor: Eisen, Ferritin, Transferrin, Transferrinsättigung, rHb
- Vor erstmaliger HD (wenn nicht bekannt) Labor: Serologie HBV, HCV, HIV 1+2
- Antibiotika müssen häufig dosisreduziert bzw. intervallverlängert werden, gerne Rücksprache mit uns. Antibiotikagabe sinnvoll nach HD, also Antibiotikum mitgeben zur HD, Applikation hier.
- EPO (Erypo) und Ferrlecit 62,5 mg zur Applikation nach HD bitte mitgeben.
- Trinkmenge bei anurischen oder oligurischen Dialysepatienten bitte beschränken! Häufig nur 0,8 - 1,2 l/d. Patient fragen oder Rücksprache mit uns.
- Keine zusätzliche HD nach Rö-KM oder Gadolinium routinemäßig indiziert.
- Bitte setzen Sie am Untersuchungstag die Diuretika ab uns vermeiden Sie Durst beim Patienten, ggf. kann die Gabe von Flüssigkeit i.v. sinnvoll sein.